

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения**

ВАЛОКОРМИД

Регистрационный номер

Торговое название Валокормид

Международное непатентованное или группировочное название

Белладонны настойка+Валерианы лекарственной корневиц с корнями настойка+Ландыша травы настойка+Натрия бромид+[Левоментол]

Лекарственная форма

Капли для приема внутрь

Состав

Активные вещества:

Валерианы настойка	10 мл
Ландыша настойка	10 мл
Красавки настойка	5 мл
Натрия бромид	4 г
L-ментол	0,25 г

Вспомогательное вещество:

Вода очищенная	до 30 мл
----------------	----------

Описание

Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, с запахом валерианы и ментола.

Фармакотерапевтическая группа

Седативное средство

КОД АТХ N05CM

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат, оказывает седативное, кардиотоническое и спазмолитическое действие. Валерианы настойка и натрия бромид уменьшают возбудимость центральной нервной системы. Ландыша настойка, содержащая сердечные гликозиды, оказывает кардиотоническое действие. Алкалоиды красавки обладают м-холиноблокирующим действием. L-ментол – местнораздражающее средство,

оказывает венотонизирующее, анальгезирующее, рефлекторное коронародилатирующее и антиангинальное действие.

Показания к применению

В качестве успокаивающего средства при функциональных расстройствах сердечно-сосудистой системы.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет, выраженный кардиосклероз, эндокардит, миокардит; печеночная и/или почечная недостаточность, дыхательная недостаточность, закрытоугольная глаукома.

С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Способ применения и дозы

Внутрь по 10-20 капель, предварительно растворив в небольшом количестве (30-50 мл) воды 2-3 раза в день до еды.

Длительность применения препарата устанавливается врачом индивидуально.

Побочное действие

Тошнота, рвота, диарея, изжога, аритмии, мышечная слабость, головная боль, парез аккомодации, возможны аллергические реакции.

Передозировка

Симптомы: явления бромизма - ринит, кашель, конъюнктивит, вялость, снижение памяти, кожная сыпь (acne bromica).

Лечение: прекращение приема, введение больших количеств (при отсутствии противопоказаний) натрия хлорида - 10-20 г в сутки (ускоряет выведение брома), обильное питье (3-5 л в сутки), диуретики.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат усиливает действие снотворных средств и других лекарственных средств, угнетающих центральную нервную систему.

Особые указания

В максимальной суточной дозе препарат содержит 0,42 г абсолютного спирта.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и занятий другими потенциально опасными видами деятельности

В период лечения необходимо воздержаться от управления транспортными средствами и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь.

По 25 мл во флаконах оранжевого стекла или флаконах-капельницах оранжевого стекла. Каждый флакон или флакон-капельницу помещают в пачку картонную. Полный текст инструкции по применению препарата наносят на пачку картонную. Флаконы или

флаконы-капельницы без пачек с равным количеством инструкций по применению помещают в групповую упаковку.

Условия хранения

В защищенном от света месте, при температуре от 15 до 25⁰С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять препарат по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Претензии потребителей направлять производителю:

ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика»

Россия, 150030 г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, 5

тел/факс (4852) 44-38-56

Директор ЗАО «Ярославская
фармацевтическая фабрика»

Л.В. Ефимова

